



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی گیلان

فرم ترجمان دانش

دانشکده پرستاری - مامایی شهید بهشتی رشت

عنوان طرح پایان نامه‌ای: مقایسه تأثیر پماد اولئا و پماد آلفا بر ترمیم زخم اپی‌زیاتومی در مادران نخست‌زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور با شاهد دارونما

مجری طرح و همکاران: دکتر پروانه رضاسلطانی، دکتر فاطمه جعفرزاده کنارسری، دکتر روجا قبادی قادیکلای، دکتر سامان معروفی‌زاده، دکتر سودابه کاظمی، سیده فاطمه مختاری

مخاطبان: ارایه‌دهندگان خدمت، عامه مردم، مسئولان و مدیران سلامت

مهم‌ترین یافته‌ها و کاربرد آن‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در این مطالعه، میانگین نمرات ترمیم زخم اپی‌زیاتومی (نمره کل مقیاس REEDA) در مادران نخست‌زا قبل از مداخله بین گروه‌های پماد اولئا، پماد آلفا و دارونما تفاوت آماری معنی‌داری نشان نداد. میانگین نمره کل مقیاس REEDA در مادران نخست‌زا در هر یک از سه گروه پماد اولئا، پماد آلفا و دارونما طی مداخله در مقاطع زمانی مختلف (۲۴ ساعت بعد از اولین مداخله و روزهای ۵ و ۱۰ پس از زایمان) کاهش معنی‌داری داشت؛ اما بین سه گروه پماد اولئا، پماد آلفا و دارونما از نظر نمره کل این مقیاس و هر یک از آیتم‌های آن (قرمزی، ادم، کبودی، ترشح و بازشدگی لبه زخم) تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده نشد. لذا شاید بتوان تجویز این پمادهای گیاهی را به‌عنوان یکی از داروهای مکمل در کنار سایر داروهای موجود جهت ترمیم زخم اپی‌زیاتومی به متخصصان امر در حیطه مامایی، زنان و بهداشت باروری پیشنهاد کرد.

کلید واژه‌ها: اپی‌زیاتومی، ترمیم زخم، پماد، اولئا، پماد آلفا، گیاه لاوسونیا، کارآزمایی بالینی تصادفی

کد اخلاق: IR.GUMS.REC.1401.022

تاریخ اتمام طرح پایان نامه‌ای: خرداد ۱۴۰۲

